

# Редкие и исчезающие растения в окрестностях Владимира

Серегин А.П., Серегин П.А., Шилов М.П.

Серегин А.П., Серегин П.А., Шилов М.П. Редкие и исчезающие растения в окрестностях г. Владимира // Флора Владимирской области: Сборник науч. статей / Под ред. И.В. Вахромеева. Владимир, 2000. С. 65–73.

Основные флористические исследования в окрестностях города проводились во второй половине XIX – начале XX веков владимирским ботаником Н.А. Казанским [Казанский, 1904, 1912]. За 130 лет флора этой территории претерпела существенные изменения [Серегин А.П., 1998]. В данной статье сделана попытка оценить распространение некоторых редких для окрестностей города растений. За основу взяты как сведения из литературных источников [Определитель..., 1986–1987; Путеводитель ботанических экскурсий..., 1971; Шилов, 1989], так и собственные исследования.

**Сальвиния плавающая (*Salvinia natans*).** Довольно часто встречается в оз. Бедины и оз. Сковородино (Загородный парк), в безымянной старице левого берега р. Клязьмы у пос. Мостострой. Возможно, в ряде других пойменных озер. Отмечалась ранее также в Рахмановской старице.

**Гроздовник многораздельный (*Botrychium multifidum*).** В последний раз был встречен в 1968 году в окрестностях пос. Коммунар в сосновом лесу. При дальнейших исследованиях возможны новые находки этого вида (особенно на левобережье р. Клязьмы).

**Плаун булавовидный (*Lycopodium clavatum*), плаун годичный (*L. annotinum*), диффазиаструм сплюснутый (*Dyphasiastrum complanatum*).** Данные виды были обычны для хвойных лесов в окрестностях Владимира, однако сбор этих растений для хозяйственных целей, сведение лесов и вытаптывание подстилки привели к их резкому сокращению. В настоящее время в лесах к югу от р. Клязьмы обычен лишь плаун булавовидный, другие же встречаются редко.

**Шейхцерия болотная (*Scheuchzeria palustris*).** В окрестностях города известно только одно местонахождение: сфагновая сплавина на оз. Плавучее (1 км к западу от пос. Мостострой).

**Мятлик луковичный (*Poa bulbosa*).** Найдено в 1968 году на Боголюбовском лугу на возвышенной пойменной гриве, однако через два года исчезло. С тех пор повторных находок не было. Вид, возможно, был распространен на остепненных лугах Ополья в доагрикультурный период.

**Очеретник белый (*Rhynchospora alba*).** Единственная популяция этого вида в окрестностях Владимира известна на сфагновой сплавине оз. Плавучее.

**Осока весенняя (*Carex caryophyllea*).** Вид обнаружен в 1998 году у северной границы г. Владимира по облесенному склону южной экспозиции на высоком коренном берегу р. Рпень (в районе ул. Куйбышева). В 1999 году осока найдена также на остепненном лугу по склону оврага в 1 км к северу от с. Боголюбово (находки А.П. и П.А. Серегиных). Преимущественно степной вид, известный в области из приокских районов. Находки в Ополье лишний раз свидетельствуют о степном характере его растительного покрова.

**Гусиный лук краснеющий (*Gagea erubescens*).** Несколько растений обнаружено А.П. Серегиним на Боголюбовском лугу в 1999 году.

**Лук круглый (*Allium rotundum*).** Обнаружен в 1999 году П.А. Серегиним на песках первой надпойменной террасы р. Клязьмы в окрестностях пос. Коммунар (несколько цветущих растений).

**Спаржа лекарственная (*Asparagus officinalis*).** Изредка встречается на лугах в прирусловой части поймы. Не образует обширных зарослей. Кроме того, изредка заносится из более южных районов по железной дороге Москва – Н. Новгород.

**Купена многоцветковая (*Polygonatum multiflorum*).** Изредка встречается в

заклязьминских лесах и в лесопарке "Дружба". Из-за сбора в букеты численность этого и сходного с ним, но менее редкого вида – купены душистой (*P. officinalis*) – сокращается.

**Ирис водный** (*Iris pseudacorus*), **ирис сибирский** (*I. sibirica*). Изредка встречаются по сырым лугам, заболоченным участкам и берегам водоемов в пойме р. Клязьмы. Ирис водный можно также встретить по берегам прудов в пределах городской черты. Ирис сибирский иногда заносится по железным дорогам, разрастаясь по придорожным кюветам.

**Гнездовка настоящая** (*Neottia nidus-avis*). Изредка встречается в лесопарке "Дружба" и в окрестностях пос. Шпалорезка.

**Любка двулистная** (*Platanthera bifolia*). Изредка встречается в различных по составу лесах к югу и западу от Владимира.

**Пальчатокоренник Фукса** (*Dactylorhiza fuchsii*). Пока достаточно часто встречающийся вид в окрестностях Владимира по свежим и влажным лесам различного состава, на открытых низинных, реже переходных болотах.

**Ясколка полевая** (*Cerastium arvense*). Редкий во флоре области вид, известный из нескольких разобитых местообитаний. Найден в 1998 году в массе на газоне перед входом в лесопарк "Дружба" А.П. Серегиним.

**Волдырьник ягодный** (*Cucubalus baccifer*). Редкий пойменный вид, дважды отмечавшийся в начале в начале века. Позднее был найден около оз. Мшаное (1967 г.) и по заборам в коллективных садах за детской больницей.

**Гвоздика песчаная** (*Dianthus arenarius*). Вид, характерный для остепненных сосновых лесов, обнаруженный Н.А. Казанским в 1899 г. близ Рахмановских дач. В 1997 году повторно обнаружен А.П. Серегиним в сосновом лесу в 0,5 км южнее пос. Заклязьминский.

**Гвоздика пышная** (*D. superbis*). Одно из характерных растений пойменных лугов реки Клязьмы. Изредка встречается в окрестностях пос. Коммунар, пос. Заклязьминский, д. Ладога и других населенных пунктов. Известны находки вблизи прудов Красносельского оврага (в настоящее время эти территории застроены).

**Хохлатка плотная** (*Corydalis solida*). Встречается в лесопарке "Дружба" и его окрестностях, по оврагам к северо-востоку от Владимира, а также по старым оврагам в пределах городской черты.

**Росянка английская** (*Drosera anglica*), **росянка круглолистная** (*D. rotundifolia*). Оба вида произрастают на сфагновой сплавине в оз. Плавучем. Второй вид встречается значительно чаще<sup>1</sup>.

**Повойничек мокричный** (*Elatine alsinastrum*). Отмечался Н.А. Казанским и позднее М.П. Шиловым в мелком водоеме в притеррасной части поймы р. Клязьмы вблизи с. Луново. В последние годы находку повторить не удалось.

**Волчегодник обыкновенный** (*Daphne mezereum*). Произрастает в широколиственных участках лесопарка "Дружба" и в окрестностях аэродрома.

**Рогульник плавающий** (*Trapa natans* s.l.). Данный вид истреблен в Рахмановской старице, где отмечался сравнительно недавно. Изредка встречается в оз. Бедино и оз. Сковородино в окрестностях Загородного парка.

**Одноцветка крупноцветковая** (*Moneses uniflora*). Редкий вид. Пока известно одно местонахождение одноцветки в окрестностях Владимира: Загородный парк, ельник за дорогой на г. Радужный.

**Толокнянка обыкновенная** (*Arctostaphylos uva-ursi*). Встречается по опушкам и прогалинам сухих сосняков-зеленомшников и беломошников в Загородном парке и на территории областной больницы, где нередок, однако крупных зарослей не образует.

**Первоцвет весенний** (*Primula veris*). Встречается по опушкам широколиственных лесов в лесопарке "Дружба" и в окрестностях аэродрома.

**Золототысячник обыкновенный** (*Centaureum erythraea*). Изредка встречается по суходольным лугам к северу от г. Владимира и за р. Клязьмой.

<sup>1</sup> Среди гербарных образцов, хранящихся на кафедре ботаники ВГПУ, некоторые образцы отвечают описанию росянки обратнойцевидной (*D. × obovata*), редкого гибридного вида.

**Горечавка крестовидная (*Gentiana cruciata*).** Вид найден Н.А. Казанским в 1900 году в Марьиной роще и у с. Спасское. В последнее время вид зафиксирован между с. Борисовское и пос. Садовый по остепненному склону оврага (находка В.В. Романова).

**Шлемник копьелистный (*Scutellaria hastifolia*).** Отмечался Н.А. Казанским по сухим лесам в окрестностях с. Лунево у старицы по дороге на Черную речку. Произрастает данный вид в этом месте и в настоящее время.

**Коровяк мучнистый (*Verbascum lychnitis*).** Растет в небольшом числе экземпляров по сухим сосновым лесам и вырубкам в Загородном парке по дороге на Муром.

**Мытник Кауфмана (*Pedicularis kaufmannii*).** Небольшие заросли расположены на луговых участках в окрестностях лесопарка "Дружба" и по берегам реки Содышка.

**Линнея северная (*Linnaea borealis*).** Типичное растение ненарушенных хвойных лесов. Известно из окрестностей д. Ладога, с. Кусуново, пос. Коммунар и пос. Мостострой.

**Колокольчик персиколистный (*Campanula persicifolia*).** Изредка встречается во Владимире (по оврагам) и его окрестностях: пос. Коммунар, с. Лунево, пос. Юрьеvec, д. Богослово и др.

**Колокольчик широколистный (*C. latifolia*).** Изредка встречается в широколиственных участках лесопарка "Дружба".

**Бубенчик лилиелистный (*Adenophora lilifolia*).** Отмечается время от времени в пойме р. Клязьмы между г. Владимиром и пос. Мостострой (по обоим берегам реки).

**Белокопытник гибридный (*Petasites hybridus*).** Заносное растение, постепенно расширяющее свой ареал. В окрестностях Владимира впервые было зафиксировано Н.А. Казанским в начале XX века на обочине ж.д. напротив церкви Вознесения. В настоящее время кроме обширной и хорошо плодоносящей популяции вдоль ж.д. Москва – Н. Новгород (западнее автомобильного моста через Клязьму), отмечена также популяция на дне оврага на ул. Сакко-и-Ванцетти.

Целый ряд видов, отмеченных в конце XIX – начале XX веков в окрестностях Владимира, в последние десятилетия не обнаружен (вероятно, некоторые из них могут быть найдены при более детальных исследованиях). К таким видам относятся: пузырник ломкий (*Cystopteris fragilis*), уховник обыкновенный (*Ophioglossum vulgatum*), наяда малая (*Najas minor*), пушица стройная (*Eriophorum gracile*), осока лесная (*Carex sylvatica*), фиалка персиколистная (*Viola persicifolia*), повойничек болотниковый (*Elatine callitrichoides*), колдуница парижская (*Circaea lutetiana*), ветреница дубравная (*Anemone nemorosa*), змееголовник Рюйша (*Dracopcephalum ruyschiana*), тимьян ползучий (*Thymus serpyllum*), мытник скипетровидный (*Pedicularis sceptrum-carolinum*), кубышка малая (*Nuphar pumila*), белозор болотный (*Parnassia palustris*), морощка (*Rubus chamaemorus*), острокильница чернеющая (*Lembotropis nigricans*), горошек кашубский (*Vicia cassubica*), башмачок настоящий (*Cypripedium calceolus*), башмачок крапчатый (*C. guttatum*), тайник яйцевидный (*Listera ovata*), дремлик широколистный (*Epipactis helleborine*), поллопестник зеленый (*Coeloglossum viride*), любка зеленоцветковая (*Platanthera chlorantha*), кокушник длиннорогий (*Gymnadenia conopsea*), колокольчик жестколистный (*Campanula cervicaria*), колокольчик рапунцелевидный (*C. rapunculoides*), скерда тупоконечная (*Crepis praemorsa*), скерда сибирская (*C. sibirica*).