

Три вида лука (*Allium* L., *Alliaceae*) с Таманского полуострова, новых для флоры Кавказа

А.П. Серегин

Three species of the genus *Allium* L. (*Alliaceae*) from Taman Peninsula, novelties for Caucasian flora

A.P. Seregin

Серегин А.П. Три вида лука (*Allium* L., *Alliaceae*) с Таманского полуострова, новых для флоры Кавказа // Бюл. МОИП. Отд. биол. 2004. Т. 109, вып. 3. С. 89.

Во время визита в Гербарий Ботанического института имени В.Л. Комарова РАН (LE) в ноябре — декабре 2003 г. мы обрабатывали материал по семейству *Alliaceae* для нового определителя растений Крыма. Кроме крымских сборов, мы обратились к сборам по некоторым видам со смежных территорий (Кавказ, Украина, юг Европейской России). В результате было обнаружено три образца Е.В. Шифферс-Рафалович, собранных во время поездок на Таманский полуостров в 1926—1928 гг. и представляющих три новых вида для флоры Кавказа (Кудряшова, 1992, 2001). Эти виды известны из прилегающих районов Южной Украины и юга Европейской России и связаны с засоленными местообитаниями.

Allium pervestitum Klokov (sect. *Allium*): Таманский полуостров, балка близ Тамани, 31.V 1928, E. Schiffers (LE). — Эндемичный вид приморских восточноевропейских степей. Этот лук был известен только из Южной Украины (Запорожская и Херсонская области). Омельчук-Мякушко (1979) указала этот вид также для территории России ("Нижн.-Дон.: зап."), однако непонятно, на чем основано это указание. По-видимому, первое наше указание — первое для флоры России, подтвержденное гербарным образцом. От близкого *A. rotundum* L. отличается более мелкими листочками околоцветника (около 3,5 мм, а не 5—7 (8) мм), лишенными пурпурной пигментации, и более длинными, чем листочки околоцветника (а не почти равными им) тычинками. Кроме того, для *A. rotundum* чужды засоленные местообитания.

A. regelianum A. Becker ex Iljin (sect. *Allium*): Таманский полуостров, ст. Старотитаровская, вершина Капустиной балки, 22.VII 1926, E. Schiffers (LE). — Эндемичный вид засоленных местообитаний восточноевропейских степей. Согласно нашим данным, он встречается на юге Европейской России (запад Калмыкии, южная часть Волгоградской обл., Ростовская обл.) и на Украине (Днепропетровская, Херсонская и, по-видимому, другие области, Крым). Этот лук, занесенный в Красную книгу РСФСР (1988), приводился для Кавказа Беккером из окрестностей Дербента (Введенский, 1935; Гроссгейм, 1949), хотя и с некоторым сомнением (Гроссгейм, 1940). Считается (Кудряшова, 2001), что это указание действительно было ошибочным. Поскольку вид нередок в сопредельных районах Ростовской обл., наверняка последуют новые для Кавказа находки в степных районах Краснодарского и, в особенности, Ставропольского краев. От *A. sphaerocephalon* L. отличается немногочисленными бурыми матовыми веретенообразно вытянутыми луковичками (а не многочисленными желтоватыми блестящими округлыми луковичками), слегка выставленными из околоцветника (а не скрытыми в нем) пыльниками и более коротким столбиком. Для *A. sphaerocephalon* также чужды засоленные местообитания.

A. praescissum Reichenb. (sect. *Codonoprasum* Reichenb.): Таманский полуостров, склоны Горелой Могилы, 19.VII 1926, E. Schiffers (LE). — Вид широко распространен по местообитаниям в степной зоне Евразии от Левобережной Украины до юга Западной Сибири. На Таманском полуострове находится на крайнем юго-западном пределе ареала.

От комплекса близких видов из родства *A. paniculatum* L. s.l. отличается трубчатым или бокальчатым (а не колокольчатым) околоцветником, тупыми или усеченными линейными (а не заостренными про долговато-ланцетными) листочками околоцветника, которые заметно ярче окрашены в верхней части в пурпурные тона (а не окрашены равномерно в розовые тона).

Литература

- Введенский А.И. Род 267. Лук — *Allium* L. // Флора СССР. Т. 4. Л., 1935. С. 112–280.
- Гроссгейм А.А. Флора Кавказа. 2-е изд. Т. 2. Баку, 1940. 284 + 143 + 14 с. (АН СССР. Азерб. филиал. Тр. Бот. ин-та. Т. 10).
- Гроссгейм А.А. Определитель растений Кавказа. М., 1949. 748 с.
- Красная книга РСФСР. Растения. М., 1988. 591 с.
- Кудряшова Г.Л. Конспект видов рода *Allium* (*Alliaceae*) Кавказа // Бот. журн. 1992. Т. 77. № 4. С. 86–88.
- Кудряшова Г.Л. Обзор видов рода *Allium* (*Alliaceae*) Кавказа // Бот. журн. 2001. Т. 86. № 4. С. 119–132.
- Омельчук-Мякушко Т.Я. Сем. 167. *Alliaceae* J.G. Agardh — Луковые // Флора европейской части СССР. Т. 4. Л., 1979. С. 261–276.