Род 1. *Thésium* L. — Лене́ц

- 1. У основания цв. на концах цвтн. есть только листовидный прцв., боковые прицветнички отсутствуют. Р. длиннокорневищное. Стб. расставленные, отходят по одному. Мн. 10–30.
 - 1. *T. ebracteátum* Hayne **Л. бесприцветничковый** (рис. 66)
 - V–VI. Боры и боровые опушки, светлые сухие лиственные леса, степи, остепнённые луга, сухие кустарники. Преимущественно на лёгких почвах. Почти во всех обл., кроме Иван., Костр., Смол., Твер., Яросл., в северных районах редко; указывается для Белг.
 - Вид включён в Приложение І Бернской Конвенции.
- 2. Цв. четырёхчленный. Длина орешка примерно равна длине сохраняющейся не верхушке пл. части оклцв. Мн. 15–30.
 - 2. T. alpínum L. (T. litwinówii V. Petrov) Л. альпийский
 - VI. Сухие лесные опушки. Твер. (на Вышневолоцкой моренной гряде). Изолированный фрагмент ареала центральноевропейского вида.
- 3. Простёртые низкорослые р. Рёбра (5 основных и 5 промежуточных) на орешках толстые, хорошо выраженные, между ними находятся поперечные менее толстые морщинки, образующие сетку. Л. (и цвтн.) в прикорневой части простёртых побегов сильно от них отклонены и направлены вверх. Мн. 5–10.
 - 3. T. procumbens C.A. Mey. Л. простёртый
 - (VI)VII–VIII. Степные склоны, выходы известняков. Белг., Курск., редко; известные сборы из Ворон. относятся к T. arvense.



Рис. 66. *Thesium ebracteatum*: 1 — общий вид, 2 — цветок.

- **4.** Р. с ползучими подземными побегами и (или) короткими косыми корневищами. Надземные побеги отходят поодиночке, иногда несколько сближенные. Оклцв. во время цветения ок. 4 мм дл. (считая от прцв.). Обычно на развитых веточках соцв. (хотя бы некоторых) сидит по 2–3 цв. Мн. (15)20–45.
 - 4. T. linophýllon L. Л. льнолистный
 - VI–VII. Светлые леса, опушки. Брян. (долина р. Усожи в окрестн. с. Голышино, Севский р-н). Западный вид. В Белг. (окрестн. г. Короча) известен только по образцу Линдемана середины XIX в. (впрочем, растение собрано в начале цветения и без подземных органов). Указание для Ворон. (Бобровский уезд) ошибочно (см. примечание к следующему виду).
- Р. с каудексом или со стержневым корнем. Обычно многочисленные побеги отходят от одной точки. Оклцв. во время цветения менее 4 мм дл. Боковые ветви (иногда они отходят ниже основного соцв.) несут большее число цв.
- 5. Цв. в редких простых кистях, расположенных на концах стб. и длинных боковых ветвей, выходящих под острым углом из пазух срединных л. Боковые ветви при пл. прямые (не искривлённые в узлах). Мн. (может зацветать на первый год). 15–35.
 - 5. T. arvénse Horvát (T. moesiácum auct.) Л. полевой
 - (V)VI–VII. Различные сухие открытые местообитания степи, луга, опушки, обочины дорог, выходы известняков и мелов, пески. В южных районах часто, севернее чернозёмной полосы заметно реже, часто только как заносное растение (например, во Влад., Твер.). Известен во всех обл., кроме пока Иван., Костр., Смол., Яросл. На основании единственного угнетённого экземпляра для Ворон. (Бобр. у., горы от Митиной до Подгорной) Н.Н. Цвелёв (1996) приводит *Т. moesiacum* Velen., отличающийся от *Т. arvense* мясистыми листьями. Впрочем, автор сам говорит о том, что «надёжных экземпляров вида нет». На наш взгляд, речь идет об особях *Т. arvense*, выросших на незадернованных меловых и известняковых склонах они отличаются некоторой суккулентностью, короткими цветоножками (из-за чего кисти узкие и компактные) и орешками, часто превышающими по длине прицветнички. Подобные экземпляры известны из Белг., Ворон., Лип.
- Цв. в более плотных яйцевидных сложных кистях, поскольку в пазухах л. сидят короткие боковые ветви, обычно сильно отставленные от оси соцв., а при пл. немного искривлённые в узлах. Жилки на орешках менее выражены. Мн. 10–35.
 - 6. T. refráctum C.A. Mey. Л. преломлённый
 - VI–VII. Заносное по ж. д. Чув. (Канашский р-н). Ближайшие местонахождения этого более восточного вида в природных местообитаниях находятся на Южном Урале.