- 5. **S.** × *versicolor* (Willd.) G.L. Nesom (*S. novi-belgii* × *S. laeve*; *Áster versicolor* Willd.) **C. разноцветный** VII–VIII. Разводится и дичает; встречается в населённых пунктах и у дорог, например, в Твер.
- Язычки краевых цв. б.ч. бледно-голубые. Ножи корзинок с несколькими (обычно более 4) небольшими верхушечными л. Лч. обёртки ланцетные, длинно заострённые, чаще прижатые. Л. на веточках, несущих корзинки, быстро увеличиваются по размерам к основанию веточки. Высота обёртки 5–6 мм. Мн. 30–100. б. *S. lanceolátum* (Willd.) G.L. Nesom [Áster lanceolátus Willd.] С. ланцетный VII—X. Разводится и дичает, встречается не только в населённых пунктах и у дорог, но также в приречных ивняках, на сырых лугах, по заросшим осокой берегам ручьёв. Наиболее частый у нас вид группы американских астр. Брян., Влад., Ворон., Калуж., Курск., Лип., Морд., Моск., Орл., Тамб., Твер., Тул.; указывается для Иван. и Яросл., прежние указания для Нижег. не подтверждены достоверным материалом.

## Род 54. Erigeron L. — Мелколепестник

- 2. В опушении стб., помимо прижатых, отогнутых вниз коротких волосков, есть отстоящие длинные волоски. Одн, дв., малолетник. 40–90. 1. *E. ánnuus* (L.) Pers. [Stenáctis ánnua (L.) Cass.; Phalacrolóma ánnuum (L.) Dumort., Ph. septentrionále (Fern. et Weigel) Tzvelev] М. одно-

обл. Родина — Сев. Америка.

- летний VI–IX. По сбитым лугам, вырубкам, залежам, у жилья и возле дорог. Во всех
- Этот вид нередко разделяют на два: *E. annuus* s. str. у которого стеблевые л. ланцетные или овальные, крупнозубчатые, с острой верхушкой, краевые цветки корзинок нередко окрашенные розоватые или бледно-сиреневые, и *E. septentrionalis* стеблевые л. более узкие, иногда линейные, б.ч. цельнокрайные, с тупой верхушкой, краевые цв. белые. Последний иногда включают в состав *E. strigosus*, как, например, во «Flora of North America».
- Стб. опушён только короткими прижатыми отогнутыми вниз волосками, длинных волосков нет. Одн., дв. 20–60.
  - 2. E. strigósus Muhl. ex Willd. [Stenáctis strigósa (L.) DC.; Phalacrolóma strigósum (Muhl. ex Willd.) Tzvelev] М. щетинистый VI–IX. По сухим лугам, боровым пескам, залежам, у жилья и возле дорог, преимущественно на лёгких почвах. Редкое заносное растение. Ряз. Родина Сев. Америка.
- 3(1). Краевые цв. беловатые, реже светло-фиолетовые, с узким язычком, пестичные, остальные обоеполые. Корзинки мелкие, 3–5(8) мм шир., многочисленные, в ветвистых кистях, собранных в узкую метёлку; лч. обёртки неплотно прилегающие, почти голые, по краям широкоперепончатые. Стб. прямой, зелёный, жёстко-шероховатый. Л. линейно-ланцетные, щетинисто-реснитчатые. Одн. 5–100.
  - 3. E. canadénsis L. [Conýza cananadénsis (L.) Cronq.] М. канадский (рис. 196)
  - VI–IX. По сорным местам, паровым полям, берегам водоёмов, песчаным местам. Во всех обл., обыкновенно. Родина Сев. Америка.
- Краевые цв. корзинки светло-лиловые, красноватые или розовые (редко белые), разнородные: наружные ложноязычковые с узким отгибом, пестичные; далее узкотрубчатые, с недоразвитым язычком, также пестичные; остальные обоеполые. Л. коротко заострённые. Корзинки крупнее, 6–15 мм шир.
- **4.** Краевые цветки красноватые или красно-розовые, заметно более тёмные, чем внутренние цв. в корзинке. Стб. и л. с однородным редким опушением отстоящих простых волосков. Одн. 15–30.
  - 4. *E. droebachiénsis* O.F. Muell. (*E. macrophýllus* auct. non Herbich, p. p.) **М.** дрёбакский
  - VI—IX. По боровым пескам, вырубкам, у дорог, на песчаных местах. Влад., Моск., Нижег., Ульян. Активно расселяющийся европейский заносный (?) вид, по-видимому, распространённый шире.




Рис. 196. *Erigeron canadensis*: 1 — общий вид, 2 — семянка.

- 360 Сем. 94. Compositae — Сложноцветные — Краевые цв. розовые, бледно-розовые или бледно-сиреневые. Опущение стб. и л. более густое, обычно из волосков разной длины: длинных щетинистых отстоящих и коротких полуприжатых, нередко с при-5. Стеблевые л. б.м. рыхло расположенные. Корзинки 6-12 мм шир., в рыхлом кистевидном или щитковидном соцв. Дв. 15-50. 5. E. ácris L. (E. ácer L., E. uralénsis Less.) — M. едкий Вторая половина V–VI. По сухим лугам, полянам, полям, около дорог. Во всех обл., очень обыкновенно. Стеблевые л. б.м. многочисленные, более 15, вверх направленные. Корзинки 9-15 мм шир., в б.м. густом щитковидном соцв. Дв. 40-60. 6. E. podólicus Bess. — М. подольский VII–VIII. Вид, замещающий предыдущий в степных обл., встречается в типичном виде в Ворон., Курск., Сарат., однако и севернее, в лесостепи встречаются растения, промежуточные между E. acris и E. podolicus. Нужны дополнительные наблюдения в природе для выяснения соотношения распространения этих видов и видовой самостоятельности E. podolicus. Род 55. Ánthemis L. — Пупавка 1. Ложноязычковые цв. жёлтые или оранжевые. Ложе соцв. полушаровидное или короткоконическое. Мн. Ложноязычковые цв. белые. Ложе соцв. удлинённо-коническое. Одн., реже дв. с тонкими корнями ..... 3 2. Пкустч. с одревесневающим у основания стб. Ветви почти безлистные, несущие по одной корзинке. Молодые л. беловато-войлочные, позднее серовато-войлочные, иногда почти голые, несколько мясистые; дважды перисторассечённые. Корзинки относительно небольшие, ок. 2 см в диам.; плёнчатые чешуи ложа корзинки продолговатые, внезанно переходящие в длинное остроконечие. Семянки четырёхгранные, не сплюснутые. 10-30. 1. A. trotzkiána Claus ex Bunge — П. Тронкого VII-IX. На обнажениях мела и известняка. Самар., Сарат. Редкое растение. Травянистое р. Корзинки более крупные, до 3 см в диам.; плёнчатые чешуи ложа корзинки широколинейные, оттянутые в длинное остроконечие. Семянки заметно сплюснутые, на поперечном разрезе ромбические, по обеим сторонам с 5 рёбрышками. Мн. 30-50. 2. A. tinctória L. (A. subtinctória Dobrocz.) — П. красильная VI–IX. На травяных склонах, сухих лугах, полях, у дорог. Во всех обл. 3(1). Плёнчатые чешуи ложа корзинки линейно-шиловидные, постепенно заострённые, при наружных цв.
- корзинки обычно совсем отсутствуют. Краевые цв. бесполые. Семянки почти цилиндрические, бугорчато-ребристые. Р. слабоволосистое, часто почти голое, с сильным неприятным запахом. Одн. 15-30.
  - 3. A. cótula L. П. собачья

VI–VIII. У дорог, на полях, в населённых пунктах. Белг., Брян., Влад., Ворон., Калуж., Курск., Моск., Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Смол., Тамб., Твер., Тул., Ульян.

- Плёнчатые чешуи ложа корзинки ланцетные или обратнояйцевидные, на верхушке с б.м. длинным остроконечием. Краевые цв. пестичные. Семянки тупочетырёхгранные, гладкие. Р. без сильного непри-
- 4. Р. прижато-волосистое или почти голое. Чешуи ланцетные, цельнокрайные. Семянки краевых цв. на верхушке без коронки или с едва заметной коронкой. Одн., дв. 15-50.
  - 4. A. arvénsis L. П. полевая

VII-VIII. На полях, травянистых склонах, сухих лугах, у дорог. Встречается в более северных обл.; нет достоверных сведений из Белг., Костр., Курск., Нижег., Самар., Сарат., Тамб.

Р. с густым шерстистым отстоящим опушением. Чешуи более широкие, обратнояйцевидно-продолговатые, к основанию суженные, в верхней части по краю б.м. зазубренные. Семянки краевых цв. на верхушке с очень короткой, но хорошо заметной, срезанной коронкой. Одн., мн. 10-40.

5. A. ruthénica Bieb. — П. русская

VI-VIII. На сухих лугах, полях, у дорог в южных обл. «Флоры...», севернее чернозёмной полосы как редкое заносное растение: в Моск., Твер. по ж. д.

В Иван., Моск. обнаружена средиземноморская A. altissima L. — П. высочайшая, у которой прицветные чешуи с расширенным основанием и более длинным оствевидным окончанием.

## Род 56. Achilléa L. — Тысячелистник

- 1. Л. цельные, по краю зубчатые. Обёртки 3-8 мм в диам. Ложноязычковые цв. белые, в количестве 6-12.
- Л. просто или дважды перисторассечённые. Корзинки более многочисленные и менее крупные (обёртки их 2-4 мм шир.). Ложноязычковые цв. белые, розовые или жёлтые, обычно в количестве 3-6. Се-