

V. По влажным лесам и лесным оврагам в западной части чернозёмной полосы. Брян., Влад., Калуж., Курск., Лип., Моск., Орл., Саратов., Тул.  
Вид занесён в Красную книгу РФ.

#### Род 4. *Tulipa* L. — Тюльпán

1. Лч. оклщ. при основании, как и нити тч., голые. Лч. наружного круга по ширине равны внутренним ... 2  
— Внутренние лч. оклщ. при основании, как и нити тч., волосистые. Лч. наружного круга уже внутрен-  
них ..... 3
2. Л. сизые, до 60 мм шир., в числе 3–4. Стб. голый или слабо опушённый. Покровные чешуи луковиц  
чёрно-бурые, с внутренней стороны покрыты прижатыми щетинистыми волосками. Цв. 30–50 мм дл.,  
с лёгким ароматом, красные или жёлтые с чёрным или жёлтым пятном у основания лч. оклщ. или без  
пятна. Мн. 20–40.  
1. *T. schrenkii* Regel — **Т. Шренка**  
IV–V. В степях, среди кустарников. Ворон., Саратов., ? Тамб. (старые сборы), ? Ульянов., редко.  
Вид занесён в Красную книгу РФ.  
— Л. сизоватые, до 60 мм шир., в числе 3–4. Стб. голый. Покровные чешуи луковиц буро-каштановые, с  
внутренней стороны почти голые. Цв. без аромата, красные, жёлтые, белые, с пятном у основания лч.  
оклщ. Мн. 20–40.  
2. *T. gesneriana* L. — **Т. Геснера**  
IV–VI. Культивируется как декоративное растение во многих обл. «Флоры...».  
Родоначальник современных садовых тюльпанов, объединяемых под общим названием *T. × hybrida* hort.
- 3(1). Лч. оклщ. 15–35 мм дл., беловато-сиреневые, в основании жёлтые; лч. наружного круга снаружи се-  
роватые. Цв. одиночный, перед раскрытием поникший, позднее прямостоячий. Мн. 20–30.  
3. *T. pátens* Agardh ex Schult. et Schult. fil. — **Т. поникший**  
IV. В степях, на солончаках, каменистых и глинистых местах. ? Саратов.  
— Лч. оклщ. 15–40 мм дл., жёлтые; лч. наружного круга снаружи серовато-сиреневые. Плн. в 2–3 раза  
короче тычиночной нити. Цв. 1–2, обычно прямостоячие. Мн. 10–45.  
4. *T. biebersteiniána* Schult. et Schult. fil. (*T. quercetorum* Klokov et Zoz) — **Т. Биберштейна**  
V–VI. В сухих степях, на пойменных лугах в долинах крупных рек, на лесных опушках и полянах. Белг., Влад.,  
Ворон., Лип., Морд., Моск. (долина р. Оки), Пенз., Самар., Саратов., Тамб., Татар., Ульянов.  
Полиморфный вид, представленный двумя экологическими формами — лугово-лесной и степной, различающи-  
мися по ширине и толщине л., по степени плотности покровных чешуй луковиц. В частности, *T. quercetorum* —  
лесная мезофильная форма вида.

### Порядок *Asparagáles* — Спаржецвётные

#### Сем. 125. *Alliaceae* Agardh s. l. — Лúковые

##### Род *Allium* L. — Лук

1. Соцв. из цв. и бульбочек (луковичек, формирующихся в соцв.) или только из бульбочек ..... 2  
— Соцв. только из цв. .... 5
2. Соцв. только из бульбочек или из бульбочек и немногочисленных недоразвитых цв. (оклщ. до 2 мм  
дл.). Внутри луковицы формируются несколько дочерних луковиц (зубчиков), которые полностью за-  
мещают её. Внешние оболочки луковицы белые, не кожистые. Мн. 60–95.  
1. *A. sativum* L. — **Чеснóк**  
VII–VIII. Культивируется во всех областях. Регулярно заносится на сорные места, обочины дорог и, реже, на луга,  
а также может сохраняться несколько лет в местах бывшей культуры. Не натурализуется.  
— Соцв. обычно из бульбочек и нормально развитых цв. (оклщ. свыше 4 мм дл.). Луковица не замещает-  
ся несколькими дочерними луковицами-зубчиками. Внешние оболочки луковиц слегка кожистые, тём-  
ные ..... 3
3. Оклщ. 6–7(8) мм дл., беловатый, кремовый, зеленоватый или розоватый, никогда не бывает пурпур-  
ным. Нити всех тч. однотипные, простые, без боковых зубцов. Л. цилиндрические или желобчатые,  
нитевидные, полые, обычно менее 1(–2) мм шир. Чехол, окружающий соцв., из двух длинных узких  
сегментов. Мн. 25–90.  
2. *A. oleraceum* L. — **Л. огородный**  
VI–VIII. По лугам, степям, пойменным пескам, лесным опушкам, листовым лесам. Во всех обл., к северо-вос-  
току гораздо реже. В широколиственных лесах часто встречается в нецветущем состоянии.  
— Оклщ. ок. 5 мм дл., пурпурные или тёмно-розовые. Тычиночные нити двух типов: простые у 3 внеш-  
них тч. и с 2 длинными боковыми зубцами у внутренних тч. Л. плоские, без внутренней полости,  
2–12 мм шир. Чехол соцв. широкий и короткий, разрывающийся на 1–3 неравные части ..... 4

4. Л. широкие, 5–12 мм шир. Бульбочки довольно крупные, чёрные или фиолетовые. Мн. 50–100.

3. *A. scorodoprasum* L. — **Л. причесочный, Рокамбóль**

VI–VII. На опушках лиственных лесов, в степных балках. Лип. (сборы конца XIX в. из-под с. Липовка бывшего Елецкого уезда), ? Пенз. Редко встречается в культуре.

- Л. уже, 2–6 мм шир. Бульбочки мельче, коричневые. Мн. (20)40–80.

4. *A. rotundum* L. — **Л. круглый**

VI–VIII. По склонам, среди кустарников, на лугах, иногда как сорное в лесополосах и на полях. Во всех обл.

Форма с бульбочками (см. также ст. 14). Считается, что наличие бульбочек в соцветии — признак *A. scorodoprasum*, позволяющий надёжно отличить этот вид от *A. rotundum*. Однако, в Лип. (окрестн. с. Полибино Данковского р-на) в популяции настоящего *A. rotundum* (имеющего только цв. в соцв.) были собраны растения с бульбочками. Схожий сбор есть из Пенз. (окрестн. с. Шаткино Русско-Камешкирского р-на). В других местонахождениях этого широко распространённого и довольно полиморфного вида такие случаи неизвестны.

- 5(1). Л. черешковые; листовые пластинки ланцетные, яйцевидные или широкоэллиптические, (1,5)2–5 см шир., переход в чрш. чёткий; чрш. тонкие, до 2(3) мм шир., примерно равны длине пластинок. Мн. 20–50(60).

5. *A. ursinum* L. — **Л. медвежий, Черемшá, Кóлба** (рис. 257)

V–VI. В широколиственных лесах, особенно в засечной полосе. Белг., Брян., Калуж., Курск., Лип., Моск. (крайний юг), Орл., Ряз. (крайний запад), Смол., Тул.; натурализовался в Москве и ближайшем Подмосковье.

На территории «Флоры...» встречается только ssp. *ucraïnicum* Kleopov et Oхпег с гладкими цветоножками (у типового подвида цветн. покрыты папиллами).

- Л. без черешков, нитевидные, линейные, ремневидные или узколанцетные, обычно менее 2 см шир. (если шире, то слабо отграниченный от листовой пластинки чрш. заметно шире и в несколько раз короче её) ..... 6
6. Оклцв. звездчатый, его лч. отгибаются вниз от завязи к цветн. Лч. оклцв. вытянутые, с почти параллельными краями, беловатые или чуть розоватые, с ясной розовой или зелёной жилкой ..... 7
- Оклцв. чашевидный, колокольчатый или бокальчатый, его лч. объемлют завязь; лч. оклцв. разных цветов и оттенков, если они беловатые и имеют ясную розовую жилку, то их края не параллельны ..... 9
7. Лп. тёмно-розовые. Зонтики крупные, обычно более 10 см в диам. Мн. 50–120.

6. *A. rosenbachianum* Regel — **Л. Розенбаха**

VI–VII. Изредка культивируемый вид. Иногда случайно попадает на сорные места (Моск.), какое-то время существует, но не натурализуется.

- Лп. белые, зеленоватые или светло-розовые. Зонтики мельче, не более 7 см в диам. .... 8
8. Л. обычно (1–)2(–3), (5)7–20 мм шир. Лч. оклцв. (3,5)4–5(5,5) мм дл. Тч. несколько длиннее лч. оклцв. или равны им. Весенний эфемероид. Мн. 25–50.

7. *A. tulipifolium* Ledeb. (*A. decipiens* auct., p.p.) — **Л. тюльпанолистный**

IV–V. На степных участках, преимущественно склоновых — в местах выхода глин, гипсов, карбонатов. В узкой приволжской полосе в Самар., Саратов., Ульянов. (в этих же обл., а также в Татар. встречается и в Заволжье).

- Л. обычно 3(4), 3–5(10) мм шир. Лч. оклцв. 5–6(7,5) мм дл. Тч. короче лч. оклцв. Растение, цветущее в начале лета. Мн. 45–80.

8. *A. decipiens* Fisch. ex Schult. et Schult. fil. — **Л. обманчивый**

V–VI(VII). В степях, зарослях степных кустарников, на опушках дубрав. Белг. (редко), Ворон.

В степных районах Вост. Европы произрастает типовой подвид. Указания для более восточных обл. относятся к *A. tulipifolium*.

- 9(6). Р. с одиночными эллипсоидальными или шаровидными луковичками ..... 10

- Р. луковично-корневищные; корневища иногда плохо выражены, сидящие на нём луковички узкие, цилиндрические, в несколько раз длиннее своей ширины ..... 19

10. Цветоносный побег трёхгранный. Ассимилирующий л. один. Мн. 15–30.

9. *A. paradoxum* (Bieb.) G. Don fil. — **Л. странный**

V–VI. Натурализовавшимся отмечен в Москве на территории ГБС РАН в Останкино и Ботанического сада МГУ на Воробьёвых горах.

- Цветоносный побег округлый. Ассимилирующих л. более одного ..... 11

11. Дичающие р. с мощными полыми цветоносами (полость в несколько раз превышает толщину стенок) и крупными луковичками (свыше 2 см в диам.). Л. цилиндрические, полые (дудчатые), обычно более 1 см шир. .... 12



Рис. 257. *Allium ursinum*.

- Дикорастущие р. с тонкими выполненными цветоносами и небольшими луковицами (менее 2 см в диам.). Л. плоские или дудчатые, но тогда менее 1 см шир. .... 13
12. Лч. оклцв. беловатые, 3–4 мм дл. Нити тч. едва длиннее оклцв. Наиболее широкая часть цветоносного побега находится ближе к его основанию. Мн. 70–120.
10. *A. cépa* L. — **Л. репчатый**  
VI–VII. Широко культивируется. Иногда вырастает из выброшенных луковиц на сорных местах, а также может сохраняться несколько лет в местах бывшей культуры. По-видимому, во всех областях; конкретные указания есть для Влад., Ворон., Иван., Костр., Морд., Моск., Нижег., Пенз., Твер., Тамб., Чув. Не натурализуется.
- Лч. оклцв. желтоватые, 5–7 мм дл. Нити тч. сильно выставлены из оклцв. Наиболее широкая часть цветоносного побега находится в его средней части. Мн. 40–70.
11. *A. fistulosum* L. — **Л.-батун, или дудчатый, Батун, Татарка**  
(V)VI–VII. Культивируется во всех областях, но на сорные места заносится редко (сборы есть из Моск. и Калуж., а также указ. для Пенз.). Не натурализуется.
- 13(11). Соцв. обычно б.м. густое, шаровидное или яйцевидное. Оклцв. от ярко-розового до чёрно-пурпурного. Тычиночные нити 2 типов: простые у 3 внешних тч. и с 2 длинными боковыми зубцами у внутренних тч. .... 14
- Соцв. менее густое, полушаровидное или зонтиковидное. Оклцв. желтоватый, розовый или тёмно-розовый. Нити всех тч. однотипные, простые, без боковых зубцов ..... 15
14. Плн. и особенно стлб. значительно выдаются из оклцв. Л. полые, цилиндрические. Луковички вытянутые, жёлтые, беловатые или коричневатые, полностью замещают материнскую луковицу. Мн. (30)40–75.
12. *A. sphaerocéphalon* L. — **Л. шароголовый**  
(VI)VII–VIII. В степях, на слабозадернованных обнажениях, в разреженных сосновых лесах и на их опушках. Как правило, на песчаных или карбонатных почвах. Белг., Ворон., ? Курск., Лип., Пенз., Саратов., Тамб. (юг). Для крайнего востока Ворон. (Хопёрский заповедник) указывается *A. regeliánum* A.K. Becker — **Л. регелевский** — более низкое растение (обычно до 30 см выс.) с нитями тч., равными оклцв. и плн., лишь слегка выставленными из него, а также коричневатыми матовыми луковичками. Произрастает почти исключительно на солонцах в поймах крупных рек; в соседней Волгоградской обл. нередок. Вид занесён в Красную книгу РФ и включён в Приложение 1 Бернской Конвенции.
- Плн. и стлб. находятся внутри оклцв. Л. плоские, линейные, без полости. Луковички мелкие, почти шаровидные, чёрные, фиолетовые или желтовато-бурые, находятся как под оболочками луковицы, так и на столонах под влагищами л. или снаружи луковицы. Мн. (20)40–80.
13. *A. rotundum* L. (*A. waldsteinii* G. Don fil.) — **Л. круглый**  
VI–VII. По степям, лугам, залежам, сорным местам, лесным опушкам, пойменным и боровым пескам. Во всех обл., но нет достоверных сведений для Костр., Смол. В Твер. и Ярослав. где собирался по Волге, по-видимому, исчез. В Лип. и Пенз. встречена форма с бульбочками (см. ст. 4).
- 15(13). Чехол соцв. из 2 створок, сохраняется во время цветения и плодоношения; хотя бы одна из створок в два и более раз длиннее соцв. .... 16
- Чехол соцв. из одной более короткой створки, быстро опадающий или остающийся ..... 18
16. Нити тч. заметно длиннее лч. оклцв.; плн. далеко выставлены из оклцв. Оклцв. желтоватый или грязно-розоватый с заметным сизым налетом. Мн. (15)20–50.
14. *A. paczosiánum* Tuzson — **Л. Пачоского**  
VI–VIII. По степным склонам, выходам карбонатов, боровым опушкам. Белг., Ворон., Курск., Саратов., Тамб. (с. Павлодар Уваровского р-на), Тул. (с. Кожурово Белевского р-на).
- Нити тч. короче или равны лч. оклцв.; плн. скрыты в оклцв. или слегка выставлены из него. Оклцв. розовый или пурпурный без сизого налёта ..... 17
17. Лч. колокольчатого оклцв. с остроконечием, продолговато-ланцетные, бледно-розовые, равномерно окрашенные. Мн. 20–50(60).
15. *A. paniculátum* L. (incl. *A. podolicum* Błocki ex Racib. et Szafer) — **Л. метельчатый**  
VII–VIII. По степным склонам, обнажениям карбонатов, боровым опушкам и разреженным соснякам, пойменным пескам. Белг. (юго-восток), Ворон., Курск., Лип., Моск. (сборы начала XIX в. из-под Серпухова), Орл., Пенз., Ряз., Самар. (сборы конца XIX в. из-под Сызрани), Саратов., Тамб., Тул. (д. Ниж. Изрог Каменского р-на), ? Ульянов. Многие указания из более восточных районов относятся к *A. praescissum*.
- Лч. трубчатого или узкоколокольчатого оклцв. тупые или усечённые, линейные, пурпурные, наиболее интенсивно окрашенные в верхней части. Мн. 20–50.
16. *A. praescissum* Reichb. — **Л. предвиденный**  
VII–VIII. По солонцам, глинистым степям и склонам, выходам гипса, пойменным лугам. Ворон., Лип. (юго-восток), Пенз., Самар., Саратов., Тамб. (юг), Ульянов.
- 18(15). Соцв. шаровидное или полушаровидное; цв.тн. равные. Оклцв. менее 4 мм дл. Оболочки луковицы слегка кожистые, цельные, не заходят на основание цветоноса. Мн. 15–40.
17. *A. delicátulum* Siev. ex Schult. et Schult. fil. — **Л. привлекательный**

VI–VII. На задернованных меловых и мергелистых склонах, реже на солонцеватых лугах. Сарат. (по Волге). Прежние указания для Ворон. относятся к Волгоградской обл. (Калач-на-Дону), а в Самар. произрастает только в Заволжье. По-видимому, вид с сокращающимся ареалом.

- Соцв. пучковатое, цвтн. неравные. Оклцв. от 5 мм дл. Оболочки луковичи распадаются на параллельные волокна, часто в виде узкой муфты на несколько сантиметров заходят на основание цветоноса. Мн. 10–40.

18. *A. inaequale* Janka — **Л. неравный**

VI–VIII. По степным участкам, склонам, обнажениям, боровым опушкам. На песчаной или карбонатной почве. Белг., Ворон., Курск., Лип. (по Дону), Орл. (по Олыму), Сарат.; указывался для заволжских районов Самар.

- 19(9). Внешние оболочки луковичи сетчато-волокнистые, с косо переплетёнными волокнами ..... 20

- Внешние оболочки луковичи кожистые или плёчатые, цельные или неясно расщеплённые на параллельные волокна ..... 21

- 20. Придаточные корни базальные, отходят от основания булабовидно-цилиндрического, вертикального корневища. Нити тч. в 1,2–1,5 раза длиннее оклцв.; нити внутренних тч. с маленькими, тупыми зубцами. Мн. 25–75.

19. *A. strictum* Schrad. — **Л. торчащий**

VI–VII. По степным склонам, обнажениям карбонатов. Ряз. (очень редко), Самар., Тат., Ульянов. Указания для Сарат. и Тамб., по-видимому, недостоверны. Данные для Пенз. нуждаются в проверке. Так как мы не видели гербарных образцов, поэтому не ясно, какой вид (*A. lineare* или *A. strictum*) там произрастает.

- Придаточные корни односторонние, отходят от нижней стороны горизонтального или косого корневища. Нити тч. вдвое длиннее оклцв.; нити 3-х внутренних тч. трёхраздельные, с заострёнными боковыми зубцами, немного превышающими завязь. Мн. 40–70.

20. *A. lineare* L. — **Л. линейный**

(VI) VII–VIII. По степным склонам, как правило, карбонатным. Самар., Сарат., Тат., Ульянов.; указание для Ворон. не подтверждено достоверным материалом. В Сарат. отмечены смешанные популяции из растений с разной окраской вн. — от пурпурно-фиолетовых до белых.

- 21(19). Л. цилиндрические, в сечении полые (полость в несколько раз превышает толщину стенок). Оклцв. колокольчатый,верху широко раскрытый; лч. оклцв. 7–10 мм дл., вдвое длиннее тч., ланцетные, длинно заострённые. Цвтн. обычно короче цв. Чехол соцв. в начале цветения тёмно-пурпурный. Мн. 25–55.

21. *A. schoenoprasum* L. — **Л.-скорода, Шнитт-лук, Резанец**

V–VI(VII). На пойменных лугах, каменистых берегах рек, песчаных придорожных луговинах. Дико во Влад., Иван., Костр., Лип., Морд. (по Мокше), Моск., Нижег., Ряз., Тат., Твер., Чув., Яросл. Также разводится и, как одичавший из культуры, отмечен в Ворон., Пенз., Смол., Ульянов.

- Л. в сечении плоские, без полости или полуцилиндрические, желобчатые, полые (в этом случае размер полости сопоставим с толщиной стенок). Лч. оклцв. менее 7 мм дл., равны или короче тч., тупые или коротко заострённые. Цвтн. значительно длиннее цв. Чехол соцв. беловатый ..... 22

- 22. Чехол в 2–3(–4) раза длиннее соцв., с длинным носиком, сохраняющийся. Тычиночные нити в 2 раза длиннее лч. оклцв. Л. нитевидные, обычно менее 1(1,5) мм шир., при этом на 1/4–1/2 покрывают цветонос. Мн. 20–60.

22. *A. globosum* Bieb. ex Red. — **Л. шаровидный**

VII–VIII. По степным склонам и обнажениям (глинистым, карбонатным). Ворон. (с. Волоконовка Михайловского р-на и окрестн. Каменки), Морд. (с. Селищи Атяшевского р-на), Нижег. (юг), Самар., Сарат. (по Волге), Тат., Ульянов.; указания для Тамб., по-видимому, ошибочны.

Близкий вид *A. savranicum* Bess. — Л. савранский произрастает на песчаных террасах крупных рек в сопредельных районах Волгоградской обл., для заволжских районов Тат. он указан ошибочно.

- Чехол короче соцв. или редко равен ему, иногда он опадает до начала цветения. Тычиночные нити короче, равны или чуть длиннее лч. оклцв. Л. более широкие, если нитевидные, то скучены у основания цветоноса ..... 23

- 23. Лч. оклцв. жёлтые или желтоватые. Л. нитевидные, обычно менее 1 мм шир., в мезофитных условиях до 2 мм. Невысокие степные р. с красноватым оттенком цветоносов и л. Мн. 15–30(45).

23. *A. flavescens* Bess. — **Л. желтеющий**

VI–VIII. По степям, степным склонам. Белг., Ворон., Курск., Лип., Морд., Нижег. (юг), Орл., Пенз., Ряз., Самар., Сарат., Тамб., Тат. (юго-восток), Тул., Ульянов.

Желтоватые цв. имеет также *A. obliquum* L. — **Л. косой** — мощное высокое растение с широкими зелёными л. (5–10 мм шир.) и на 1/2 облиственным цветоносом. Это сокращающийся вид, который был известен в Средней России по очень старым сборам и указаниям из Пенз. (Пенза) и Сарат. (Хвалынский), а также заволжской части Самар. (Сургут). Ближайшие современные местонахождения находятся на Южном Урале и в Зап. Украине.

- Лч. оклцв. лилово-розовые или розовые. Л. линейные или ремневидные, обычно более 2,5 мм шир. Мезофитные р. с зелёными цветоносами и л. .... 24

- 24. Л. плоские, широкие (обычно 5–15 мм) и короткие (в 2–4 раза короче цветоноса). Соцв. шаровидное. Цветонос свыше (3)5 мм в диам. Мн. 40–80.

24. *A. nutans* L. — **Л. поникший, или Л.-слизун**

Рис. 258. *Allium angulosum*.

VII–VIII. Калуж. Какое-то время сохраняется в местах бывшей культуры, но не натурализуется.

— Л. в сечении угловатые или плоско-выпуклые, гораздо уже и длиннее. Соцв. полушаровидное. Цветонос до 2 мм в диам. ... 25

25. Л. в живом виде зелёные, снизу угловатые, килеватые. Лч. оклцв. острые, равны тч. или короче их. Мн. 25–70.

25. *A. angulosum* L. — Л. угловатый (рис. 258)

V–VII. На пойменных лугах, борových террасах, в степных западинах и осино-вых кустах, а также заносное вдоль дорог. Как правило, на песчаной почве. Во всех обл., но на Среднерусской возвышенности (Курск., Белг.) очень редко; нет сборов из Орл.

— Л. в живом виде сизоватые, снизу выпуклые, без кия. Лч. оклцв. тупые, заметно длиннее тч. Мн. 20–45.

26. *A. lusitanicum* Lam. [*A. montanum* F.W. Schmidt, 1794 non Schrank, 1785; *A. senescens* L. ssp. *montanum* (F.W. Schmidt) Holub] — Л. лузитанский

VII–VIII. На придорожных луговинах. Заносный европейский вид, собранный в Моск.

## Сем. 126. *Amaryllidaceae* St.-Hil. — Амариллисовые

1. Оклцв. с коронкой (привенчиком) разной формы: от чашевидной до трубчато-колокольчатой; все лч. оклцв. одинаковые, белые или жёлтые, без пятен, при цветении растопыренные. Цв. не поникающие. Кроющий л. цв. плёнчатый ..... 3. *Narcissus* — Нарцисс

— Оклцв. без коронки, все 6 или 3 внутренние лч. с небольшим зелёным или жёлтым пятном на верхушке. Цв. колокольчатый, поникающий. Кроющий л. цв. (соцв.) травянистый ..... 2

2. Все 6 лч. оклцв. одинаковые, с пятном ..... 2. *Leucójum* — Белоцветник

— Только 3 внутренних лч. оклцв. с зелёным пятном ..... 1. *Galánthus* — Галантус

### Род 1. *Galánthus* L. — Галантус, Подснежник

Луковичные р. Л. тёмно-зелёные, сизые, плоские, при цветении до 8–10 см дл. при ширине 4–6 мм. Цв. одиночный, 15–25 мм дл.; внешние лч. оклцв. белоснежные, внутренние — короче на треть или половину, с зелёным пятном у выемчатой верхушки. Мн. 8–12.

*G. nivális* L. — Г. снежный

IV–V. Культивируется в парках и садах; способен удерживаться в местах прежней культуры. Моск. (Поречье), Ряз.

Возможны находки и других видов галантусов, например, *G. plicátus* Bieb. — Г. складчатого, со сложенными в почкосложении л., прцв. 3–5 см дл., более крупными луковичами (2–3 см в диам.) и цветочными стрелками (8–15 см дл.); внешние лч. оклцв. 23–26 мм дл. и ок. 12 мм шир.

### Род 2. *Leucójum* L. — Белоцветник

Луковичные р. с линейными ярко-зелёными л. Цв. одиночный, реже цв. 2, поникающие. Лч. оклцв. до 25 мм дл., с жёлтым или зелёным небольшим пятном у верхушки. Мн. 10–15.

*L. vérnum* L. — Б. весенний

IV–V. Способен удерживаться в местах прежней культуры, особенно в старых парках. Моск. (Поречье).

### Род 3. *Narcissus* L. — Нарцисс

1. Коронка воронковидная, длинная, обычно примерно равна по длине лч. оклцв., жёлтая, с зубчатым или волнистым краем. Мн. 20–45.

1. *N. pseudonarcissus* L. — Н. ложный

V. Популярное весеннее декоративное растение. Имеется множество сортов. Во всех обл. Иногда встречается по сорным местам рядом с дачными посёлками.

— Коронка короткая, менее 5 мм выс., жёлтая или белая с красной каймой и обычно ровным краем. Мн. 25–50.

2. *N. poëticus* L. — Н. поэтический